

Título: Cavidad ósea idiopática de Stafne: Reporte de un caso.

- Autores: CD Edson Josue Pacheco Herrera. Coautores: Dra. Patricia Furrer Franco, MCO Martha Margarita Aguado Arzola, MCO Lizeth Alejandra Reyes Alvarado Dr. Jaime Eduardo Campos Najera.
- Institución: Facultad de Odontología, Unidad Torreón, Universidad Autónoma de Coahuila.
- País: México.
- Correo electrónico: Jozue9430@Gmail.com

Descrito en 1942, con una incidencia de 0,1% y un 1,3%, reportado con más frecuencia en varones (80%), en edades de 50-60 años. La localización más frecuente es la región posterior, entre el primer molar y el ángulo de la mandíbula, suele ser asintomático, por lo que con frecuencia se diagnostica de forma incidental mediante una prueba de imagen.

Metodología

El diagnóstico por imagen se hace con tomografía computarizada o resonancia magnética. I.El tamaño suele ser de 1-2 cm de diámetro, bordes son nítidos y ligeramente escleróticos de contenido hipodenso y homogéneo.


Debe incluir lesiones de características radiolúcidas, como tumores benignos o malignos I.Ameloblastoma.

II.Tumor Queratoquístico.

III.Quiste residual.

IV.Quistes foliculares.

No precisa tratamiento quirúrgico y su tratamiento se basa únicamente en un seguimiento con pruebas radiológicas seriadas.



Resultados:

En una radiografía panorámica se puede observar una lesión bien circunscrita, radiolúcida, adyacente a la basal mandibular del lado derecho. En la tomografía computarizada podemos observar una lesión unilocular, bien circunscrita de bordes escleróticos, limitada al espacio de O.D. 46 y 47, con reabsorción de la cortical lingual.

Clinicamente no presentará aumento de volumen, de carácter asintomático.

Conclusiones:

La cavidad de Stafne es una entidad anatómica benigna y poco común, que se observa principalmente como una depresión lingual en la zona posterior de la mandíbula.